

SORTENEIGENSCHAFTEN

- Mittelspäte bis sehr späte Reifezeit
- Hohes und stabiles Ertragsniveau bei hohem Stärkegehalt
- Hoher bis sehr hoher Stärkeertrag
- Niedrig bis mittlerer Knollenansatz, großfallende Knollen
- Sehr niedrige bis niedrige Keimfreudigkeit

ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER

- Nematoden: Resistenz Ro 1,4
- Y-Virus: sehr gering
- Blattrollvirus: sehr gering
- Krautfäule: gering bis mittel
- Knollenfäule: gering
- Schorf: gering

ANBAU UND DÜNGUNG

- 3 - 4 Wochen vor Pflanzung in Keimstimmung bringen
- Legeabstand (35/55 Sort.) ca. 30 cm \approx 44.000 Pflanzen/ha
- Auf unterschiedlichen Bodenarten z.B. Sand, Lehm gutes und stabiles Ertragsniveau
- Stängelbetontes Kraut mit sehr aufrechten Wuchs dadurch gute Durchlüftung des Bestandes

- **Düngeempfehlung bei 500 - 599 dt/ha und Versorgungsstufe C**

	kg/ha	Bemerkung
N	180	Zu- und Abschläge je nach Standortbedingungen
	200	Schotterböden in drei Gaben von 80+80+40 kg N/ha
P₂O₅	80 - 90	gedüngtes Phosphat in Boden bzw. Damm einarbeiten
K₂O	150 - 200	im Frühjahr Kalisulfat, im Herbst 40er Kornkali, Chlorid haltige Dünger können im Frühj. Stärkegehalt u. Knollenertrag senken
MgO	50 - 70	Grundversorgung über Bodendünger decken, akuter Mangel kann mit Blattdüngung abgemildert werden

- ➔ Um Ertrags- und Qualitätsverluste zu vermeiden, müssen Nährstoffe aus organischen Düngern angerechnet werden.
- ➔ Auf humosen Böden die zu Manganmangel neigen gezielter Einsatz von manganhaltigen Blattdüngern.
- ➔ Die Auflagen der Düngeverordnung sind zu beachten

ERNTE UND LAGERUNG

- Gute Lagereignung
- Siebkettingeschwindigkeit so niedrig wie möglich halten
- Warm und schalenfest roden und am gleichen Tag mit dem Trockenblasen beginnen
- Kartoffelstapel einebnen